



AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR BACĂU

Nr. 1293 din 17.01.2018

*M. H. Reu*  
*na*  
*Bacau*

*Viceprimar*

COMUNA PARINCEA  
JUDEȚUL BACĂU  
18 JAN. 2018  
NR. 361  
ANEXE

CĂTRE,

TOATE UNITĂȚILE ADMINISTRATIV TERITORIALE  
DIN JUDEȚUL BACĂU

Având în vedere confirmarea în data de 12.01.2017, a unui nou focar de Pestă Porcină Africană (PPA) la porc domestic în localitatea Micula din județul SATU MARE, se impune de urgență ridicarea nivelului de alertă în scopul supravegherii și depistării precoce a acestei boli în populația susceptibilă de porci domestici și mistreți.

Pentru a preveni apariția și / sau a evita răspândirea bolii, în calitate de Unitate Locală de Sprijin în cadrul Comandamentului Local pentru Combaterea Bolilor, în conformitate cu prevederile Legii 1/2008, art.5, lit c), trebuie să luați de urgență următoarele măsuri:

- constientizarea și sensibilizarea crescătorilor de animale (prin mass media locală, postere afișate în locurile publice) privind implicațiile economice ce rezulta în urma evoluției bolii și comunicarea cu autoritățile sanitare veterinare, practicienii veterinari și crescătorii de animale în vederea:

- notificării imediate a oricărei suspiciuni de boală;
- interzicerea folosirii resturilor menajere în hrana porcilor;
- identificarea și înregistrarea tuturor suinelor la medicul veterinar;
- ridicarea gunoiului menajer;
- ecarisarea teritoriului, inclusiv a parcarilor de pe marginea drumurilor naționale care tranzitează localitățile.

Măsurile dispuse vor fi menținute în vigoare până la eliminarea riscului de propagare a bolii pe teritoriul României.

DIRECTOR EXECUTIV,  
Dr. Liviu Niky Vrabie



	Nume, Prenume	Funcția	Data	Semnatura
Avizat	Dr. Iordachi Ioan	p. Director executiv adjunct	17.01.2018	<i>[Signature]</i>
Avizat	Dr. Simion Eugenia	Sef SCOSA Consilier superior	17.01.2018	<i>[Signature]</i>
Elaborat	Dr. Conoro Constantin	Consilier superior SCOSA	17.01.2018	<i>[Signature]</i>



## PESTA PORCINĂ AFRICANĂ AMENINȚĂ SĂ SE RĂSPÂNDEASCĂ ! FIȚI ATENȚI LA SEMNELE EI !

Cine cauzează pesta porcină africană?

Pesta porcină africană este cauzată de un virus.

La ce specii este întâlnită boala?

La porcii domestici și porcii mistreți europeni de toate vârstele, indiferent de gen.

A mai evoluat boala în România?

Până în prezent au fost declarate două focare de boala la porci domestici din județul Satu Mare. Virusul poate determina pagube importante prin procentul de mortalitate ridicat, prin dificultățile de eradicare a bolii și prin restricțiile impuse comerțului, de aceea, teritoriul țării trebuie păstrat îndemnat.

Unde evoluează boala în prezent în Europa?

În Italia (insula) Sardinia, în Federația Rusă, Belarus, Ucraina și Rep. Moldova – foarte aproape de granița cu România. În ultimii zece ani, boala a mai fost prezentă în Caucaz (Georgia, Azerbaidjan, Armenia). În trecut, boala a mai fost întâlnită pe teritoriul Spaniei și al Portugaliei.

Cât de mult durează de la infectarea porcilor, până la apariția semnelor de boală?

3-15 zile, dar în forma acută de boală semnele pot apărea în 3-4 zile.

Cum arată un porc bolnav de pesta porcină africană?

Nu există semne specifice care să indice boala, semnele pot fi atribuite și altor boli.



- mortalitatea ridicată, aproape de 100%, intervenită într-un timp extrem de scurt;
  - temperatură foarte ridicată (40,5 – 42 °C) și stare febrilă;
  - roșeață sau învinetire a pielii, a marginilor urechilor, a vârfului picioarelor, a abdomenului și pieptului;
  - lipsa poftei de mâncare, apatie și împietrire în mers, care pot apărea cu 24-48 de ore înaintea morții;
  - vomitări, diaree (uneori cu sânge) și urdori la ochi;
- Cum se transmite virusul?

Prin contact direct între animalele sănătoase și cele bolnave sau indirect, prin:

- hrănirea porcilor cu resturi de la bucătărie, când originea cărnii de porc folosită la gătit nu este cunoscută;
  - vectori biologici (căpușe din anumite specii care au parazitat anterior porci bolnavi);
  - alți vectori infectați ca: vehicule, halbe, adăposturi în care a evoluat boala.
- Sursele de virus includ și:
- sânge, țesuturi, secreții și excreții de la animalele bolnave sau moarte;
  - animale care au supraviețuit îmbolnăvirii și s-au recuperat;
  - mediul extern: virusul poate rezista în fecale 6-10 zile, în produsele din porc mai multe luni, iar în carnea congelată mai multă ani.



Pot fi animalele vaccinate împotriva pestei porcine africane?

Nu există vaccin împotriva acestei boli. Măsurile de prevenire (igienă alimentară și a exploatareilor, mișcările animalelor și măsurile de control aplicate de autoritățile impunitice sunt singurele metode care pot ține boala departe.

Există tratament pentru această boală?

NU!

Ce fac în cazul în care suspectez că un porc este bolnav de pesta porcină africană?

• anunț imediat medicul veterinar impunitic de liberă practică din localitate, ori medicul veterinar oficial, ori Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din județul meu la numărul de telefon .....;

Ce vor face serviciile veterinare în cazul apariției unui focar de pesta porcină africană?

- toți porcii vor fi uciși, iar proprietarii vor primi despăgubiri pentru pierderile suferite;
  - toate cadavrele porcilor uciși vor fi distruse în condiții de maximă securitate astfel încât să se împiedice orice transmitere a bolii;
  - circulația animalelor va fi pusă sub restricții în perioada evoluției bolii, iar animalele din curțile aflate în perimetrul de restricții vor fi ținute sub observație;
  - exploatarele infectate vor fi dezinfectate, dezînsectate și deratizate, primind aprobarea pentru repopulare când condițiile sunt întrunite.
- De reținut:

Este mai bine să raportați orice suspiciune de boală, chiar dacă ea nu se va confirma, decât să nu raportați deloc! Nu vă temeți de penalizări ale guvernului, contribuția dumneavoastră este esențială în menținerea îndemnată a țării!

**TELEFONUL D.S.V.S.A. BACAU LA CARE SE VA ANUNȚA ORICE SUSPICIUNE ESTE: 0234586233**

! Se personalizează cu numărul de urgențe "teverde" al fiecărei DSVSA



## AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

### **Material informativ cu privire la pesta porcină africană destinat crescătorilor de porcine din exploatațile non-profesionale în vederea introducerii de măsuri de biosecuritate pentru animalele pe care le dețin**

Pesta porcină africană este o boală a porcinelor domestice și sălbatice, mortală pentru porcii care se îmbolnăvesc. Pentru această boală nu există vaccin, singura cale de a feri animalele fiind respectarea unor măsuri de protecție la venirea în contact cu animalele sănătoase.

**Pentru a vă proteja porcii de această boală, vă recomandăm să respectați următoarele sfaturi:**

- a. nu intrați în adăposturile unde creșteți porcii cu încălțăminte și hainele cu care ați umblat pe stradă; este recomandat chiar ca, pentru dezinfecția la intrarea în adăpost, să puneți o tăviță cu paie îmbibate cu o soluție slabă de sodă caustică;
- b. creșteți porcii doar în spații îngradite, fără posibilitatea de a veni în contact cu porci străini de curtea dumneavoastră, cu porci mistreți sau cu proprietari străini care dețin porci domestici;
- c. nu hrăniți animalele cu resturi alimentare/lături/spălătură provenite de la carnea de porc gătită în familie; dacă există vânători în familie care aduc carne de mistreț, sub nicio formă nu dați porcilor apa provenită de la spălarea cărnii sau resturi de carne;
- d. nu scoateți scroafele/vierii din exploatație în scopul moneii cu animale din altă exploatație;
- e. nu cumpărați porci din locuri necunoscute, fără a fi identificați (cu crotalie) și fără certificat sanitar veterinar de sănătate eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit;
- f. nu folosiți în hrana animalelor iarbă culeasă de pe câmp, pentru că ea ar fi putut să vină în contact cu porci mistreți bolnavi.

#### **Cum arată un porc bolnav de pestă porcină africană?**

Nu există semne clare care să indice boala, semnele pot fi atribuite și altor boli. Dar se pot observa la porcii bolnavi semne ca:

- moarte rapidă, intervenită într-un timp extrem de scurt;
- temperatură foarte ridicată (40,5 – 42 °C) și stare febrilă;
- roșeață sau învinețire a pielii, a marginilor urechilor, a vârfului picioarelor, a abdomenului și pieptului;
- lipsa poftei de mâncare, apatie și împleticire în mers;
- vomitări, diaree (uneori cu sânge) și urdori la ochi.

#### **Ce fac în cazul în care suspectez că un porc este bolnav de pestă porcină africană?**

- anunțați imediat medicul veterinar împuternicit de liberă practică din localitate, ori medicul veterinar oficial, ori Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din județul dvs. la numărul de telefon .....

Toate animalele suspecte trebuie ucise și distruse, conform legislației în vigoare, iar proprietarii vor fi despăgubiți de către stat la prețul de piață al animalelor.

#### **Ce vor face serviciile veterinare în cazul apariției unui focar de pestă porcină africană?**

- toți porcii vor fi uciși, iar proprietarii vor primi despăgubiri pentru pierderile suferite;

#### **De reținut:**

Este mai bine să raportați orice suspiciune de boală, chiar dacă ea nu se va confirma, decât să nu raportați deloc!